

Số: /TB - SXNN

Quang Khải, ngày 28 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại trên lúa vụ Chiêm xuân 2023

Hiện nay, lúa Chiêm xuân trà sớm đang trong giai đoạn đông già, thấp tho trở đến trở thoát. Trà lúa muộn đang giai đoạn đông đều đến đông già, thấp tho trở. Một số ít diện tích trà muộn phải gieo cấy lại đang trong giai đoạn đông non đến đông đều. Qua kiểm tra thực tế đồng ruộng, đã phát hiện sâu cuốn lá nhỏ và sâu non (*lúa 2*) sẽ nở rộ từ ngày 05 - 09/5/2023, có thể gây hại trên phạm vi rộng và làm ảnh hưởng lớn đến năng suất lúa.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, thời tiết tại Hải Dương có khả năng xảy ra mưa dông, kèm theo tố lốc, nhiệt độ trung bình 24°C - 30°C. Do vậy, trong thời điểm tới, bệnh đạo ôn cổ bông, đạo ôn lá sẽ có nguy cơ gây hại trên các diện tích chăm bón mất cân đối, diện tích gieo cấy các giống lúa nhiễm như: Nếp, Đài thơm 8, TBR 225, Q5...

Thực hiện Công văn số 17/TTDVNN-BVTV ngày 27/4/2023 của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Tứ Kỳ về việc tăng cường chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa Chiêm Xuân 2023; Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thời tiết và sâu bệnh gây ra, BCD SXNN, HTX DVNN chỉ đạo, tuyên truyền và hướng dẫn các hộ dân thực hiện một số công việc sau:

Đề nghị các hộ sản xuất nông nghiệp thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết, tăng cường kiểm tra đồng ruộng để chủ động phát hiện và kịp thời tiến hành các biện pháp phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn... Việc phun thuốc BVTV phải đảm bảo nguyên tắc 4 đúng “*đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng thời điểm, đúng kỹ thuật*”. Tránh lạm dụng thuốc BVTV, phun thuốc tràn lan, không hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường, tăng chi phí sản xuất và nhân lực không hợp lý. Các đối tượng sâu bệnh cần lưu ý trong thời gian tới cụ thể như sau:

1. Sâu cuốn lá nhỏ lúa 2

- Thời gian phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 2 từ ngày **05 - 09/5** trên diện tích trà muộn.
 - Đối với diện tích phải gieo cấy lại và cấy muộn sẽ phun trừ từ ngày **10 - 13/5**
- Khuyến cáo các hộ nông dân sử dụng các loại thuốc như: thuốc có hoạt chất Emamectin benzoate (*Brocom 50WG, Emaben 3.6WG...*), Flubendiamide (*Takumi 20WG...*), Indoxacarb (*Bite 30SC, Sunset 300WG...*).

Liều lượng phun theo hướng dẫn ghi trên bao bì, phun thuốc vào chiều mát, phun đảm bảo 01 bình 16 - 18 lít/sào.

* *Lưu ý: Tại những ruộng có mật độ bướm trưởng thành cao, hoặc sâu non đã tuổi lớn, nên kết hợp thuốc có nguồn gốc thảo mộc Emamectin benzoate (Brocom 50WG...) + thuốc có hoạt chất Indoxacard (Bite 30SC, Sunset 300WG) sẽ cho hiệu quả phòng trừ cao.*

2. Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, đặc biệt trên các diện tích đã bị nhiễm đạo ôn lá, phun trừ khi bệnh chớm xuất hiện. Nên phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông vào thời điểm lúa đòng già, bắt đầu trổ trên các diện tích cây giống nhiễm hoặc đã bị nhiễm đạo ôn lá (*chú ý các diện tích cây giống TBR 225, nếp...*).

- Sử dụng một trong các loại thuốc sau để trừ bệnh đạo ôn lá cũng như phòng bệnh đạo ôn cổ bông như: *Fuan 40EC, Folia 525SE, Fujone 40EC, Flash75WP...* Liều lượng, kỹ thuật sử dụng theo hướng dẫn in trên bao bì. Phun đảm bảo 01 bình từ 16 - 18 lít/sào, tránh thời điểm lúa phơi màu, phun nhắc lại lần 2 cho ruộng bị bệnh sau lần 1 từ 5 - 7 ngày.

3. Bệnh khô vằn, đen lép hạt

Do điều kiện nhiệt độ và ẩm độ cao, nắng mưa xen kẽ trong thời gian tới nên bệnh khô vằn, đen lép hạt sẽ có chiều hướng phát sinh mạnh và lây lan theo diện rộng. Để hạn chế bệnh nên phun khi bệnh chớm xuất hiện. Sử dụng các loại thuốc như: *TD Vil 50SC, Hanovil 10SC, Nevo 330EC, Tilt super 300EC...* Nồng độ thuốc phun theo hướng dẫn trên bao bì, phun đảm bảo 01 bình 16 - 18 lít/sào. Có thể phối hợp với các loại thuốc phun phòng trừ đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông.

4. Sâu đục thân hai chấm

Trên các diện tích lúa thuộc trà sớm đang trong giai đoạn đòng già đến thấp thỏ trổ, đây là thời điểm phun trừ đối tượng sâu đục thân hai chấm cho hiệu quả cao nhất. Chú ý những nơi có mật độ ổ trứng cao 0,2 - 0,5 ổ/m². Khi phun trừ sử dụng một số các loại thuốc như: *Virtako 40WG, Dupont prevathon 5SC,...* Nồng độ, liều lượng thuốc phun theo hướng dẫn trên bao bì, phun đảm bảo 01 bình 16 - 18 lít/sào.

Lưu ý: Sau khi phun trừ xong thì bao bì, chai lọ thuốc trừ sâu thu gom và tập kết ở đúng nơi quy định.

Vậy BCD SX, HTX DVNN thông báo đề các hộ sản xuất nông nghiệp trong toàn xã chủ động kiểm tra đồng ruộng và kịp thời phòng trừ có hiệu quả./.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO SX NN XÃ
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Đảng ủy, HĐND, UBND xã;
- MTTQ, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội;
- Đài truyền thanh xã
- Lưu TT.

**Phó chủ tịch
Nguyễn Hồng Thiêm**