

Số: /CV- BCĐ

Quang Khải, ngày 28 tháng 8 năm 2023

V/v tăng cường kiểm tra, phun trừ sâu
bệnh trên lúa vụ Mùa 2023

Qua kiểm tra thực tế đồng ruộng tại thời điểm hiện nay, phát hiện thấy trên những diện tích lúa cấy dày, chân ruộng trũng, diện tích lúa xanh non do chăm bón mất cân đối do việc phun trừ sâu bệnh không đảm bảo hoặc không phun kép lần 2 nên mật độ sâu cuốn lá nhỏ vẫn còn rất cao. Mật độ trung bình từ 10 - 15 con/m², có nơi cao từ 20 - 25 con/m². Vì vậy, nguy cơ sâu cuốn lá nhỏ tiếp tục phát triển và gây hại nặng trên diện rộng.

- Rầy nâu, rầy lưng trắng đã phát sinh trên các giống lúa nhiễm như các giống Nếp, Bắc thơm số 7, Q5, TBR 225... và trên những diện tích lúa cấy dày, chân ruộng trũng, mật độ trung bình 500 - 1.000 con/m², cao 2.000 - 3.000 con/m².

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn đã phát sinh và gây hại với tỷ lệ bệnh trung bình 2 - 3% số lá, cao 5 - 10% số lá.

Trước tình hình trên, BCĐ SXNN, HTX DVNN chỉ đạo, tuyên truyền và hướng dẫn các hộ dân thực hiện một số công việc sau:

1. Tiếp tục tăng cường kiểm tra và phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 6

Đối với những diện tích lúa chưa được phun kép lần 2 (từ ngày 24/8 - 26/8) hoặc phun kém hiệu quả, các hộ nông dân cần tiếp tục khẩn trương phun trừ ngay bằng các loại thuốc đặc hiệu như: Thuốc có hoạt chất Emamectin benzoate (Lion King SWG, Brocom 50WG), Flubendiamide (Takumi 20WG...), Indoxacarb (Bite 30SC...), Isocloseram (Incipio 200 SC).

Khi sâu xuất hiện với mật độ cao, nên kết hợp hai hoạt chất Emamectin benzoate hoặc Flubendiamide với Indoxacarb để phun trừ.

Hiện nay do sâu đã cuốn tổ nên cần phải phun kỹ hơn (2 bình 16 lít/sào), phun thuốc vào chiều mát. Nếu gặp trời mưa sau khi phun từ 2-3 giờ bắt buộc phải phun lại.

2. Phát hiện và phòng trừ kịp thời bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn

Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, đặc biệt lưu ý các diện tích gieo cấy giống nhiễm như BC 15, TBR 225, Bắc thơm số 7, các giống lúa lai, các giống lúa có bản lá rộng, mềm, mỏng, những chân ruộng chăm bón mất cân đối, thừa đạm... nếu phát hiện lúa bị nhiễm bạc lá, đốm sọc vi khuẩn cần phun trừ ngay bằng các loại thuốc như: Physan 20SL, Total 20WP, Sumner 20WP, Ychatot 900SP.

Liều lượng, kỹ thuật sử dụng theo hướng dẫn in trên bao bì. Phun đảm bảo 1 bình 20 - 25 lít/sào.

Lưu ý: - *Phun thuốc khi lá lúa không còn dạng nước và phun vào chiều mát*
Phun nhắc lại lần 2 cho ruộng bị bệnh sau 5 - 7 ngày.

- Trên diện tích đã nhiễm bệnh tuyệt đối không sử dụng các loại phân bón như phân bón qua lá, chất kích thích sinh trưởng, đạm Ure... để chăm bón cho lúa sau khi phun trừ bệnh đã ổn định trở lại, lá lúa không xuất hiện các vết bệnh mới thì có thể bón bổ sung thêm Kali cho lúa.

3. Kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các đối tượng gây hại khác (rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, chuột hại)

Đề nghị các hộ nông dân tiếp tục thực hiện công tác phòng trừ theo nội dung Công ngày 15/8/2023 của Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp xã.

Vậy BCD SXNN, HTX DVNN thông báo để các hộ sản xuất nông nghiệp trong toàn xã chủ động kiểm tra đồng ruộng và kịp thời phòng trừ có hiệu quả./.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO SXNN XÃ
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Đảng ủy, HĐND, UBND xã;
- MTTQ, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội;
- Đài truyền thanh xã
- Lưu VP.

**Phó chủ tịch UBND xã
Nguyễn Hồng Thiêm**