

Số: /TB-UBND

Quang Khải, ngày tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

Hướng dẫn thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng, chống bệnh Cúm gia cầm type A và các bệnh truyền nhiễm khác trong chăn nuôi gia cầm

Theo thông tin từ Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và PTNT), từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước đã xảy ra 34 ổ dịch Cúm gia cầm (CGC) tại 19 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy là trên 77.000 con gia cầm. Đặc biệt, theo thông tin của Bộ Y tế, ngày 05/10/2022 đã có 01 trường hợp bệnh nhân nhiễm virus Cúm gia cầm type A/H5 tại tỉnh Phú Thọ.

Hiện nay, trên địa bàn xã nhà nhiều cơ sở chăn nuôi gia cầm chưa thực hiện tốt quy trình phòng chống dịch bệnh theo phương pháp an toàn sinh học, nhất là đối với những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Công tác kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia cầm chưa được thực hiện nghiêm túc, triệt để. Bên cạnh đó, thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa với những diễn biến phức tạp, thất thường đã ảnh hưởng xấu đến sức đề kháng của vật nuôi. Đây chính là những nguyên nhân làm virus Cúm gia cầm phát triển và lây lan, nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong thời gian tới là rất cao.

Thực hiện Công điện khẩn số 7601/CD-BNN-TY ngày 21/10/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Công văn số 1414/UBND-DVNN ngày 25/10/2022 của UBND huyện Tứ Kỳ, Hướng dẫn số 03/HD-TTĐVNN ngày 16/11/2022 của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện hướng dẫn thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng, chống bệnh Cúm gia cầm type A và các bệnh truyền nhiễm khác trong chăn nuôi gia cầm. UBND xã khuyến cáo, hướng dẫn các hộ chăn nuôi gia cầm trên địa bàn thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm như sau:

1. Thông tin chung về bệnh Cúm gia cầm type A

- Bệnh Cúm gia cầm là bệnh truyền nhiễm ở gia cầm (bao gồm cả gia cầm nuôi và chim hoang dã), do virus cúm type A thuộc họ Orthomyxoviridae. Virus Cúm gia cầm có nhiều chủng, tuy nhiên căn cứ độc lực virus Cúm gia cầm được phân loại thành các chủng virus Cúm gia cầm độc lực cao và các chủng virus Cúm gia cầm độc lực thấp.

- Khi gà mắc bệnh Cúm gia cầm type A với chủng virus có độc lực cao (H5N1, H5N6, H5N8) thì tỷ lệ chết có thể lên đến 100%. Riêng với các loại thủy cầm (vịt, ngan...), khi mắc bệnh có thể có hoặc không có triệu chứng nhưng vẫn mang mầm bệnh và là nguồn chủ yếu gieo rắc virus Cúm gia cầm ra ngoài môi trường.

- Virus Cúm gia cầm có thể sống tới 35 ngày trong chuồng nuôi có nhiệt độ thấp, tới 3 tháng trong phân gia cầm mắc bệnh, trong tủ đá virus có thể sống được vài tháng.

Tuy nhiên virus dễ dàng bị tiêu diệt bởi các chất sát trùng thông thường như: Iodin 1%, xút 2%, phóc-môn 3%, vôi bột hoặc nước vôi 10%...hoặc ở nhiệt độ 70°C trong 5 phút.

- Đường truyền lây: trực tiếp từ gia cầm mắc bệnh tiếp xúc với gia cầm mắc bệnh hoặc gián tiếp qua những dụng cụ chăn nuôi, thức ăn, nước uống, phương tiện vận chuyển có nhiễm mầm bệnh...

2. Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm type A

2.1. Đảm bảo các yêu cầu quy cách về chuồng trại

- Xây dựng chuồng trại đảm bảo xa khu dân cư, cơ quan, trường học, chợ, đường giao thông ít nhất từ 500m trở lên. Ở Việt Nam chuồng thiết kế theo hướng Đông - Tây, chính diện chuồng theo hướng Bắc - Nam là phù hợp nhất, đồng thời đảm bảo cao ráo, ẩm về mùa Đông, thoáng mát về mùa Hè. Riêng đối với gà sinh sản và gà đẻ trứng thương phẩm, nên đầu tư xây dựng hệ thống chuồng kín.

- Tại cổng trại có hệ thống bơm và vòi nước áp lực để rửa các loại phương tiện, tiếp đến là hố sát trùng để sát trùng ủng và bánh xe, đầu mỗi khu vực chăn nuôi và đầu mỗi dãy chuồng có vòi nước để rửa ủng và có hố sát trùng.

2.2. Thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh, tiêu độc khử trùng

- Trong quá trình chăn nuôi thường xuyên thực hiện công tác vệ sinh chuồng trại, phát quang, khơi thông cống rãnh, rắc vôi bột xung quanh chuồng nuôi và các lối đi.

- Thực hiện phun khử trùng toàn bộ người, phương tiện ra vào và khu vực chăn nuôi.

- Trong điều kiện không có dịch bệnh, định kỳ phun thuốc sát trùng 2 lần/1tuần đối với toàn bộ khu trại, kể cả khu vực xung quanh. Các loại hóa chất có thể dùng là: Hanlusep, Haniodin, Vikon... Liều lượng pha thuốc và cách sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

2.3. Thực hiện nghiêm ngặt quy trình phòng bệnh bằng vaccin

- Thực hiện tiêm phòng đầy đủ và theo đúng quy trình các loại vaccin phòng bệnh Cúm gia cầm và các loại vaccin khác cho đàn gia cầm như: Mareck, Lasota, Gumboro, Đậu, Newcastle, Tụ huyết trùng... để phòng bệnh Cúm gia cầm và các bệnh truyền nhiễm kế phát khác. Đặc biệt đối với vaccin Cúm gia cầm cần lưu ý các yêu cầu kỹ thuật sau:

*** Loại vắc xin: NAVET- FLUVAC 2.**

Cách dùng - liều dùng: Tiêm dưới da cổ (1/3 phần dưới, sau cổ).

- Tiêm vắc xin cho gà con ở 14- 21 ngày tuổi với liều 0,3ml/con.

- Gà thịt > 21 ngày tuổi, gà đẻ tiêm liều 0,5ml/con và tiêm nhắc lại sau mỗi đầu 10-14 ngày với liều 0,5 ml/con. Sau đó cứ 6 tháng tiêm nhắc lại 1 lần

- Vịt, ngan, ngỗng từ 14 ngày tuổi: tiêm liều 0,5ml/con và tiêm nhắc lại sau mũi đầu 10 - 14 ngày với liều 0,5 ml/con. Sau đó cứ 6 tháng tiêm nhắc lại 1 lần.

- Chim cút ở 14 - 21 ngày tuổi: tiêm liều 0,3 ml/con; tiêm nhắc lại sau mũi đầu 10 - 14 ngày với liều 0,3 ml/con.

Chú ý khi sử dụng:

- Không dùng vắc xin cho gia cầm đang mắc bệnh.

- Không sử dụng chai vắc xin đã bị nứt, bật nắp, mất nhãn, nhãn không có số lô - ngày sản xuất - hạn sử dụng hoặc đã hết hạn sử dụng, có hiện tượng phân tách lớp dung dịch vắc xin trong lọ.

- Lọ vắc xin sau khi lấy từ nơi bảo quản ra, nên để ấm tự nhiên ở nhiệt độ phòng (20 – 30°C) khoảng 30 phút. Lắc kỹ trước khi dùng. Sau khi mở nắp, lọ vắc xin chỉ sử dụng trong vòng 24 giờ. Trong quá trình sử dụng, lưu ý không được để ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào lọ vắc xin.

- Tiêm đúng vị trí hướng dẫn; tránh tiêm vào mạch máu và tránh đâm kim tiêm vào xương cổ của gia cầm.

- Thường xuyên thay kim trong khi tiêm vắc xin (tiêm 50 con thay kim 1 lần).

- Ngưng sử dụng vắc xin cho gia cầm 14 ngày trước khi giết mổ.

2.4. Thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý đàn gia cầm

- Các hộ chăn nuôi khi nhập con giống nên nhập ở các cơ sở áp nử đạt tiêu chuẩn an toàn dịch bệnh đã được các cấp có thẩm quyền chứng nhận, được kiểm dịch chặt chẽ, đồng thời thực hiện khai báo với chính quyền địa phương để giám sát dịch bệnh theo quy định của Luật Chăn nuôi.

- Nuôi riêng biệt từng loại gia cầm theo từng khu: Khu ấp nở, khu gà con đang úm, gà hậu bị, gà đẻ, khu dự trữ thức ăn... Không nuôi hỗn hợp nhiều loại gia súc, gia cầm với nhau như gà, vịt, ngan, ngỗng, lợn, trâu bò... trong cùng một khu chăn nuôi. Trong thời điểm có dịch bệnh uy hiếp, chỉ nên quản lý gia cầm ở trong trại, không nuôi thả gia cầm tự do.

- Thức ăn, nước uống phải đầy đủ, có chất lượng tốt, thường xuyên bổ sung thêm các loại vitamin C, vitamin nhóm B, điện giải, men tiêu hóa... để tăng sức đề kháng cho đàn gia cầm.

- Sử dụng các chế phẩm vi sinh ứng dụng trong chăn nuôi gia cầm (xử lý đệm lót, trộn thức ăn...).

2.5. Biện pháp phát hiện sớm dịch bệnh và xử lý ổ dịch

- Bệnh Cúm gia cầm thường có biểu hiện triệu chứng, bệnh tích như sau:

+ Gia cầm mắc bệnh Cúm gia cầm thể độc lực cao có thời gian ủ bệnh ngắn, thường từ 01- 03 ngày, do vậy gia cầm mắc bệnh thường bị chết đột ngột (có thể không

có biểu hiện triệu chứng lâm sàng), tỷ lệ chết có thể lên tới 100% tổng đàn trong vòng một vài ngày.

+ Gia cầm khi mắc bệnh có triệu chứng đi lại loạng choạng, lắc đầu, run rẩy, mệt mỏi, nằm tụ tập từng đám; có biểu hiện ở đường hô hấp như ho, khó thở, sổ mũi, chảy nước mũi, thở khò khè, viêm xoang, sưng viêm mí mắt, mào và tích tím tái; xuất huyết dưới da, đặc biệt ở những chỗ da không có lông; tiêu chảy phân loãng, màu trắng hoặc trắng xanh, năng suất trứng giảm rõ rệt ở những đàn gia cầm đang đẻ.

+ Mô khám bệnh tích thấy: Xuất huyết lan tràn ở hầu hết các cơ quan nội tạng như: khí quản, tim, phổi, gan, lách, thận, dạ dày, manh tràng, ruột non, cơ quan sinh dục...

- Hàng ngày theo dõi chặt chẽ sức khỏe đàn gia cầm, khi phát hiện gia cầm có biểu hiện mắc bệnh nghi ngờ Cúm gia cầm cần báo ngay cho cơ quan Thú y để có các biện pháp xử lý kịp thời, tránh lây lan dịch bệnh.

- Thực hiện đúng nguyên tắc “5 không” trong chăn nuôi gia cầm: không giấu dịch; không mua bán gia cầm, sản phẩm gia cầm mắc bệnh; không bán chạy gia cầm mắc bệnh; không vận chuyển gia cầm bị mắc bệnh ra khỏi vùng dịch; không vứt xác gia cầm bừa bãi ra môi trường.

Phòng chống dịch bệnh Cúm gia cầm và các bệnh truyền nhiễm khác phát sinh và lây lan là nhiệm vụ quan trọng hiện nay nhằm bảo vệ sản xuất chăn nuôi và sức khỏe người dân. Ủy ban nhân dân xã thông báo để các cơ sở chăn nuôi gia cầm nắm được và tự giác thực hiện./.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy;
- TT HĐND, lãnh đạo UBND;
- Trưởng các Tổ chức chính trị - xã hội;
- 3 Trưởng thôn;
- Đài truyền thanh;
- Lưu.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hồng Thiêm