

Số: /TB-BCĐ

Quang Khải, ngày tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO

**Về việc tăng cường thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Mùa
và hướng dẫn phòng trừ bệnh lùn sọc đen, bệnh vàng lùn lụi trên lúa
và cỏ dại, diệt ốc bươu vàng vụ Mùa 2022**

Thực hiện nội dung Công văn số 933/UBND-DVNN ngày 24/6/2022 và Công văn số 966/UBND-NN&PTNT ngày 06/7/2022 của UBND huyện Tứ Kỳ, Hướng dẫn số 03/HD-TTĐVNN ngày 07/7/2022 của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Tứ Kỳ. Ban chỉ đạo sản xuất xã yêu cầu HTX DVNN và nhân dân tập trung thực hiện một số nội dung như sau:

1. Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp

- Tập trung điều tiết nước phục vụ sản xuất cho kịp thời vụ.
- HTX DVNN kết hợp với lãnh đạo các thôn chỉ đạo xã viên tiếp tục dọn dẹp nương máng và làm thủy lợi nội đồng.
- Tiếp tục vận động xã viên tập trung phương tiện làm đất phục vụ gieo cấy. Phân đầu hoàn thành gieo cấy trước 20/7/2022.
- Hướng dẫn xã viên thực hiện các biện pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa và cây rau màu vụ hè thu. Tuyên truyền để các hộ nhân dân thực hiện việc tốt công tác thu gom, không vứt vỏ bao bì thuốc BVTV đã qua sử dụng trên đồng ruộng.
- Chuẩn bị công tác đánh chuột đợt 1 vụ mùa năm 2022, đồng thời phát động chiến dịch “Tuần lễ diệt chuột” đồng loạt trên địa bàn toàn xã.

2. Các hộ sản xuất nông nghiệp

Các hộ sản xuất nông nghiệp cần thực hiện nghiêm khung thời vụ đã được thông báo. Khẩn trương tập trung các phương tiện máy móc làm đất các khu vực chưa được làm đất. Phân đầu hoàn thành gieo cấy vụ Mùa xong trước ngày 20/7/2022.

Lưu ý: do vụ Mùa thường có mưa bão, vì vậy để đảm bảo công tác chống úng được kịp thời, hiệu quả đề nghị các hộ nhân dân tuyệt đối không gieo vãi tại các khu triều trũng.

3. Các biện pháp trừ rầy lưng trắng, rầy xanh đuôi đen trên diện tích mạ được để diệt trừ môi giới truyền bệnh lùn sọc đen và vàng lùn lụi

Thường xuyên kiểm tra những diện tích mạ được và phun trừ kịp thời rầy lưng trắng, rầy xanh đuôi đen để loại trừ môi giới truyền bệnh lùn sọc đen và bệnh vàng lụi.

Thời điểm phun trước khi nhổ cấy từ 4 - 5 ngày.

Sử dụng một trong các loại thuốc như: Marshal 200SC, Oshin 20WP, Chess 50WG...Liều lượng sử dụng theo hướng dẫn ghi trên bao bì của nhà sản xuất, phun đảm bảo 1 bình 16 lít/sào mạ, nên phun thuốc vào sáng sớm hoặc chiều mát.

4. Tiến hành các biện pháp trừ cỏ trên ruộng canh tác

4.1. Biện pháp thủ công và canh tác

- Vệ sinh đồng ruộng, mương máng trước khi gieo cấy.
- Làm đất kỹ và trang ruộng bằng phẳng; thu gom, xử lý triệt để rác, cỏ dại trên mặt ruộng.

- Đối với diện tích lúa gieo thẳng, sau khi hạt giống đã cắm rễ và cây mầm cao từ 1 – 2 cm cần điều tiết mực nước trên mặt ruộng khoảng 0,5 - 1,0 cm để cây lúa phát triển tốt và hạn chế cỏ dại. Nếu mưa ngập phải bơm, tháo gạn kịp thời.

4.2. Biện pháp hoá học

a) Đối với lúa gieo thẳng:

Chỉ sử dụng nhóm thuốc cỏ tiền nảy mầm sớm, có khả năng diệt cả cỏ một lá mầm và hai lá mầm như Sofit 300EC, Butafit 320EC, Chani 300EC... Nhóm thuốc này sử dụng tốt nhất ngay sau khi gieo sạ từ 0 - 3 ngày. Sau khi xử lý thuốc trừ cỏ, cần duy trì độ ẩm trong ruộng. Tuyệt đối không để nước đọng trên ruộng sẽ làm cho móng mạ bị chết và hiệu quả trừ cỏ không cao.

b) Đối với lúa cấy mạ sân:

Nên sử dụng nhóm thuốc tiền nảy mầm dòng hoạt chất Butacholor như: Butafit 320EC, Heco 600EC, Taco 600EC... Nhóm thuốc này sử dụng sau khi cấy từ 3 - 5 ngày, ruộng phải có từ 3 - 5 cm nước và giữ nước trong ruộng từ 5 - 7 ngày.

Có thể sử dụng các loại thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm sớm như: Vitarai 18.5WP, Sofit Gold 271WP... Nhóm này có thể dùng để rắc hoặc phun sau cấy từ 5 - 21 ngày, cần duy trì mực nước trên ruộng từ 1 – 2 cm trong thời gian từ 5 - 7 ngày (Tuyệt đối không sử dụng các thuốc Acenidax 17WP, Arorax 17WP, Aloha 25WP... cho lúa cấy mạ sân do làm ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của lúa).

c) Đối với lúa cấy mạ dước:

Ngoài sử dụng nhóm thuốc trừ cỏ như lúa cấy mạ sân còn có thể sử dụng một số thuốc trừ cỏ khác như: Ferim 18.5WP, Acenidax 17WP, Arorax 17WP, Aloha25wp... Phun hoặc trộn với đất bột mịn để rắc sau cấy từ 7 - 10 ngày. Khi rắc hoặc phun thì trên mặt ruộng phải có tối thiểu 2 - 3 cm nước. Tuyệt đối không để nước ngập nổi cây lúa.

** Chú ý:*

- Khi sử dụng thuốc cỏ phải tùy thuộc vào đặc tính của thuốc mà điều chỉnh mức nước trên ruộng cho phù hợp để phát huy hết khả năng diệt cỏ của thuốc.

- Phải phun hoặc rắc đều trên ruộng, tốt nhất là phun thuốc.
- Không nên phun lại nhiều lần thuốc trừ cỏ trên cùng diện tích lúa cây, trừ trường hợp những ruộng bị mưa ngập tràn bờ ngay sau khi phun thuốc.

5. Kiểm tra, phát hiện kịp thời ốc bươu vàng (OBV)

Thường xuyên kiểm tra những diện tích lúa gieo cấy, đặc biệt chú ý các diện tích gieo thẳng hoặc cấy mạ trên sân, những diện tích lúa thuộc khu triều trũng và gần kênh mương để phát hiện và xử lý kịp thời đối tượng OBV phá hại bằng biện pháp sau:

- Biện pháp thủ công
 - + Tạo các rãnh nhỏ xung quanh ruộng, khi tháo nước ốc tập trung ở rãnh rồi thu gom.
 - + Cắm cọc rải rác quanh ruộng để ốc đẻ trứng lên, sau đó thu gom trứng ốc.
 - + Tại các vị trí dẫn nước vào ruộng nên đặt lưới để ngăn chặn ốc xâm nhập.
- Biện pháp hoá học
 - + Chỉ sử dụng thuốc trừ OBV khi phát hiện thấy có ốc xuất hiện. Không phun thuốc tràn lan gây lãng phí vật tư và làm ô nhiễm môi trường.
 - + Sử dụng các loại thuốc trừ ốc như: VTDax 700 WP, Padol 700WP, Clodan supe 700WP... phun thuốc với nồng độ và liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất (Căn cứ vào mực nước trên ruộng để điều chỉnh nồng độ thuốc cho phù hợp, nâng cao hiệu quả diệt ốc), nên phun thuốc vào sáng sớm hoặc chiều mát.

6. Hưởng ứng tham gia chiến dịch “Tuần lễ diệt chuột” đồng loạt trên địa bàn toàn xã ở tất cả các cánh đồng, khu dân cư, khu chuyển đổi, hành lang đường...

Công tác sản xuất vụ mùa đang trong thời điểm quan trọng, để vụ sản xuất đạt kết quả tốt, Ban chỉ đạo sản xuất xã yêu cầu HTX DVNN và các hộ sản xuất thực hiện nghiêm nội dung thông báo này.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy;
- TT HĐND, lãnh đạo UBND xã;
- Ban chỉ đạo sản xuất, HTX DVNN;
- Lưu.

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Thiêm